

Desinfektionsplan Podologie



Was?	Wann?	Womit?	Dosierung	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
Hygienische Händedesinfektion	bei Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach dem Ablegen von Handschuhen, nach dem Kontakt mit infektiösen Personen / Material	MyClean HB OpSept MyClean	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände vollständig mit Präparat benetzen (Hohlhand gefüllt), 30 Sekunden lang feuchthalten und gegeneinander reiben.	alle Mitarbeiter
Händewaschung	bei Arbeitsbeginn, vor Pausen, nach Toilettengang, nach Arbeitsende, bei Verschmutzung, bei Bedarf	MyClean WL	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtüchern trocknen.	alle Mitarbeiter
Hautschutz	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, vor Feuchtarbeiten, bei Bedarf	MyClean Handlotion lipid (W/O)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalzen und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
Hautpflege	vor Pausen, nach der Arbeit, nach jeder Hautreinigung, bei Bedarf	MyClean Handlotion (O/W)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalzen und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
Vorbeugender Hautschutz	bei allen Arbeiten, bei denen die Möglichkeit der Kontamination mit Blut, Sekreten und Ausscheidungen gegeben ist sowie im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen	unsterile Untersuchungshandschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei ggf. sterile OP-Handschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei <u>Umgang mit Chemikalien / Desinfektionsmitteln</u> dickwandige Schutzhandschuhe nach EN 374 1, 2, 3 mit langem Schaft			Über die trockene Hand ziehen. Desinfektionsmittel und Hautschutzcreme / Hautpflegelotion müssen vollständig abgetrocknet / eingezogen sein.	alle Mitarbeiter
Hautantiseptik	vor der Behandlung	MyClean A	gebrauchsfertig	15 Sekunden 1 Minute (talgdrüsenreiche Haut)	Hautpartien einsprühen / einreiben und einwirken lassen.	benannte Person
Instrumente	wenn möglich Einmalinstrumente verwenden sofort nach Gebrauch	MyClean IN Ultraschallbad: MyClean IN	3 % 3 %	30 Minuten 5 Minuten	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelanbieterangaben in eine Instrumentenwanne einlegen.	benannte Person
Rotierende Instrumente	sofort nach Gebrauch	MyClean B	gebrauchsfertig	5 Minuten (bei gut vorgereinigtem Instrumentarium) 15 Minuten	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelanbieterangaben in eine Instrumentenwanne einlegen.	benannte Person
Kleine Flächen z. B. Arbeitsfläche	bei Benutzerwechsel, bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen	MyClean DS MyClean DS A MyClean DS OA	gebrauchsfertig gebrauchsfertig gebrauchsfertig	1 Minute 1 Minute 1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen, einwirken lassen.	benannte Person
Große Flächen	bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen	MyClean FD	0,5 % 1,0 %	1 Stunde 30 Minuten	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen, einwirken lassen.	benannte Person
Wäsche	Nach Gebrauch, bei sichtbarer Verschmutzung	vor Ort (gemäß Herstellerangaben) mit geeigneter Waschmaschine / Waschpräparat			Kochwaschgang oder 60 °C Waschgang und desinfizierendes Waschmittel	benannte Person

Merke:

Für die Durchführung aller Desinfektionsarbeiten sind die Regeln der **TRBA 250** verbindlich. **Konzentration** und **Einwirkzeit beachten**. Bei Desinfektionslösungen immer zuerst kaltes Wasser, dann Desinfektionsmittel zugeben. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht zur Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind geeignete **Schutzhandschuhe** zu tragen (Sicherheitsdatenblatt beachten). Über die Inhalte des Desinfektionsplans sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen. (Grundlagen sind: § 4 BGV A1, § 12 BioStoffV, § 12 ArbSchG). Die Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten.

Dieser Plan ist auf Basis aktueller Empfehlungen und Richtlinien erstellt – Die Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt dem Anwender.