

Desinfektionsplan Tattoo- und Piercingstudio



Was?	Wann?	Womit?	Dosierung	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
<p>Hygienische Händedesinfektion</p>	vor und nach jeder Behandlung bei denen die Haut arbeitsgemäß verletzt wird, vor der Arbeitsvorbereitung, bei Unterbrechung der Behandlung (Ablegen der Handschuhe nach Kontakt mit infektiösem Material / Blut)	MyClean HB OpSept MyClean	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände vollständig mit Präparat benetzen (Hohlhand gefüllt), 30 Sekunden lang feuchthalten und gegeneinander reiben.	alle Mitarbeiter
<p>Chirurgische Händedesinfektion</p>	Piercing: vor Einbringung von Fremdkörpern unter die Haut	MyClean HB OpSept MyClean	gebrauchsfertig	1,5 Minuten 3 Minuten	Hände und Unterarme vollständig mit Präparat benetzen. Anziehen (steriler) Handschuhe	alle Mitarbeiter
<p>Händewaschung</p>	bei Arbeitsbeginn, vor Pausen, nach Toilettengang, nach Arbeitsende, bei Verschmutzung, bei Bedarf	MyClean WL	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtüchern trocknen.	alle Mitarbeiter
<p>Hautschutz</p>	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, vor Feuchtarbeiten, bei Bedarf	MyClean Handlotion lipid (W/O)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalten und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
<p>Hautpflege</p>	vor Pausen, nach der Arbeit, nach jeder Hautreinigung (wenn kein Hautschutz erforderlich), bei Bedarf	MyClean Handlotion (O/W)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalten und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
<p>Vorbeugender Hautschutz</p>	bei allen Arbeiten, bei denen die Möglichkeit der Kontamination mit Blut, Sekreten und Ausscheidungen gegeben ist sowie im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen	unsterile Untersuchungshandschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei ggf. sterile OP-Handschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei <u>Umgang mit Chemikalien / Desinfektionsmitteln</u> dickwandige Schutzhandschuhe nach EN 374 1, 2, 3 mit langem Schaft			Über die trockene Hand ziehen. Desinfektionsmittel und Hautschutzcreme / Hautpfegelotion müssen vollständig abgetrocknet / eingezogen sein.	alle Mitarbeiter
<p>Hautantiseptik</p>	vor der Behandlung	MyClean A	gebrauchsfertig	15 Sekunden 1 Minute (talgdrüsenreiche Haut)	Hautpartien einsprühen / einreiben und einwirken lassen.	alle Mitarbeiter
<p>Instrumente</p>	wenn möglich Einmalinstrumente verwenden sofort nach Gebrauch	MyClean IN	2 % 3 % 4 %	1 Stunde 30 Minuten 15 Minuten	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelherstellangaben in eine Instrumentenwanne einlegen.	alle Mitarbeiter
<p>Flächen & Abfalleimer z. B. Arbeitsfläche</p>	Nach jeder Behandlung, bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen mind. 1x täglich	MyClean FD MyClean DS MyClean DS A MyClean DS OA	0,5 % gebrauchsfertig gebrauchsfertig gebrauchsfertig	1 Stunde 1 Minute 1 Minute 1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	alle Mitarbeiter

Merke:

Für die Durchführung aller Desinfektionsarbeiten sind die Regeln der TRBA 250 verbindlich. **Konzentration** und **Einwirkzeit beachten**. Bei Desinfektionslösungen immer zuerst kaltes Wasser, dann Desinfektionsmittel zugeben. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht zur Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind geeignete **Schutzhandschuhe** zu tragen (Sicherheitsdatenblatt beachten). Über die Inhalte des Desinfektionsplans sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen. (Grundlagen sind: § 4 BGV A1, § 12 BioStoffV, § 12 ArbSchG). Die Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten.

Dieser Plan ist auf Basis aktueller Empfehlungen und Richtlinien erstellt – Die Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt dem Anwender.